

	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEP	OCT	NOV	DÉC
 Visites de la ruche												
 Miellées												
 Pose des hausses												
 Risque d'essaimage												
 Récolte du miel												
 Traitement varroa												
 Nourrissement												
 Élevage de reines												
 Hivernage												

Période forte Période moyenne Période faible / possible Moment critique à ne pas manquer

**Mai — l'essaimage**

Le pic. **Visitez tous les 7-10 jours** : des cellules royales operculées annoncent un départ imminent. Donnez de la place, divisez.

**Août — le varroa**

Le mois qui décide de l'hiver. **Traitez dès la dernière récolte** : les abeilles d'hiver naissent maintenant et doivent être saines.

**Septembre — les réserves**

Complétez au sirop **avant les premiers froids**. Une colonie qui entre en hiver légère ne verra pas le printemps.

Repères indicatifs pour un climat tempéré — votre région, votre altitude et l'année peuvent décaler les périodes de 2 à 3 semaines.
Observez toujours vos colonies : le calendrier guide, les abeilles décident.

Janvier Repos - Colonie en grappe : ne pas ouvrir. - Soupez pour contrôler le poids. - Dégagez les entrées (neige, mortes). Oxalique hors couvain si pas fait. - Atelier : matériel, cadres.	Février Reprise - La reine repond : besoins en hausse. Candi si la ruche est légère. - Sorties de propreté par temps doux. - Le pollen rentrant = bon signe. ▲ Ouvrir tue le couvain naissant.	Mars 1re visite Visite de printemps dès 15 °C. - Reine, ponte, réserves, cadres. Resserrez les faibles. - Nettoyez les planchers. - Comptez la chute de varroas.
Avril Croissance - Le couvain explose. Posez les hausses (7-8 cadres occupés). - Miellées : colza, pissenlit, fruitiers. - Surveillez les cellules royales. - Renouvelez 2-3 vieux cadres.	Mai Essaimage ▲ Pic : visitez tous les 7-10 j. - Cellules operculées = départ proche. - De la place, divisez, élevez. - Haussez avant saturation. Essaims artificiels : c'est le moment.	Juin Miellée - Acacia, tilleul, ronce, châtaignier. - Première récolte possible. - Essaimage en baisse, restez vigilant. - Assurez l'eau au rucher. - Contrôlez les jeunes reines.
Juillet Récolte Récolte : cadres operculés seulement. ▲ Attention au pillage. - Les miellées s'achèvent. - Le varroa grimpe : comptez. - Laissez des réserves à la colonie.	Août Varroa ▲ Traitez dès la dernière récolte. - Trop tard = colonie perdue en hiver. - Hausses retirées avant traitement. - Les abeilles d'hiver naissent. - Réduisez les entrées.	Septembre Réserves Nourrissez au sirop épais (2:1). - Objectif ≈ 15-18 kg selon région. - Vérifiez reine et ponte. - Regroupez les colonies faibles. - Guêpes et pillage : entrées réduites.
Octobre Préparation - Dernier contrôle du poids. - Fin du nourrissage. Portes anti-souris en place. - Toit étanche, ruche inclinée. - Abritez du vent dominant.	Novembre Hivernage - Visites terminées : paix aux ruches. - Observez le trou de vol de loin. - Entrées dégagées. - Bilan de saison, comptes. - Cire fondue, cadres préparés.	Décembre Hors couvain ▲ Oxalique : période sans couvain. - Intervention rapide, ruche fermée. - Soupez : candi si légère. - Vérifiez après les tempêtes. - Formez-vous, planifiez la saison.
✿ Les miellées principales Printemps : saule, pissenlit, colza, fruitiers, aubépine Début d'été : acacia, ronce, tilleul, châtaignier Été : trèfle, tournesol, lavande, sarrasin Fin de saison : lierre — essentiel pour l'hivernage	⚠ Les 4 erreurs qui coûtent une colonie Traiter le varroa trop tard : les abeilles d'hiver naissent infectées. Ouvrir trop tôt au printemps : le couvain refroidi meurt. Tout récolter : la colonie meurt de faim. Manquer l'essaimage : la moitié de la colonie part.	

Document indicatif — adaptez à votre région et à l'observation de vos colonies. En cas de doute sanitaire, consultez votre section apicole ou un vétérinaire.